

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION MIDI-PYRENEES

## ÉDITION GRANDES CULTURES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
Rue Saint-Jean • B.P. 19 • 31131 BALMA CEDEX  
Tél. Standard : 61.24.70.70 - Technique : 61.24.70.33  
Abonnement : 61.24.70.30

Régisseur de Recettes  
D.R.A.F. "MIDI-PYRÉNÉES"  
CCP : 8618-62 Y Toulouse  
I.S.S.N. : 0752-2053

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ABONNEMENT ANNUEL : 200 F.

BULLETIN N° 3 DU 21 FEVRIER 1992

### Attention

Avis aux personnes qui n'ont pas encore renouvelé leur abonnement pour 1992 à l'édition GRANDES CULTURES : **ce bulletin est le dernier qui leur sera envoyé.**  
Ce rappel, adressé à l'ensemble de nos abonnés, ne doit pas être pris en compte si vous avez déjà effectué votre réabonnement.

## COLZA

### Stades végétatifs

Ils s'échelonnent de C1 (reprise de végétation) à C2 (étranglement vert à la base des nouveaux pétioles).

### CHARANCON DE LA TIGE

#### Situation

Le vol du charançon de la tige a débuté à partir du 11 février dans la Haute-Garonne et le Tarn. Il s'est généralisé ensuite.

#### Prévision

Les pontes des femelles, limite tardive de la lutte, devraient intervenir dès l'apparition du prochain redoux.

#### Préconisation

***Intervenir rapidement en utilisant un produit efficace contre le charançon de la tige (cf. Fiche "RAVAGEURS DU COLZA" envoyée le 12 septembre 1991).***

***Diverses spécialités de pyréthriinoïdes sont homologuées pour cet usage.***

***Remarque : Ne pas confondre le charançon de la tige du colza avec le charançon de la tige du chou, actuellement le plus fréquent dans les cuvettes jaunes.***

## CEREALES

### JAUNISSE NANISANTE DE L'ORGE

#### Situation

- Depuis le 23 décembre 1991, aucun vol de puceron vecteur n'a été enregistré.
- Les parcelles levées avant le 20 décembre, correctement traitées, sont indemnes.
- Les parcelles levées postérieurement au 20 décembre n'ont pas été colonisées. Attention toutefois à la confusion avec d'autres insectes (diptères le plus souvent) observés lors d'après-midi douces dans plusieurs situations.
- Seules les parcelles levées début Novembre et non ou mal protégées présentent des populations de pucerons non négligeables.

#### Préconisation

***Une intervention insecticide dirigée contre les pucerons ne serait actuellement envisageable que sur les semis les plus tardifs (blés durs, orges brassicoles), lorsque la présence effective de pucerons est constatée, cas très rare à ce jour (nous adresser éventuellement des échantillons en cas de doute).***

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le dépliant "PROTECTION DES CEREALES", à la rédaction duquel la Protection des Végétaux a participé.  
Conservez-le soigneusement. Il y sera fait référence dans nos prochains bulletins.